



Natuurkalender voor het plannen van activiteiten in verband met soortbescherming

Plannen voor natuurwaardenonderzoek

De onderstaande tabel geeft een overzicht van mogelijke soortgroepen die in een plangebied kunnen voorkomen of daar afhankelijk van zijn. De groene balken geven aan wanneer dan mogelijk (nader) onderzoek kan plaatsvinden. In sommige gevallen (o.a. met vleermuizen en broedvogels) kan de doorlooptijd van een zorgvuldig uitgevoerd flora- en faunaonderzoek tot 6-8 maanden bedragen. Daarom wordt altijd eerst verkennend gekeken met een ecologische 'quickscan' of nader en uitgebreid onderzoek noodzakelijk is en in welke vorm het dan moet plaatsvinden.

	JAN	FEB	MA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEC
Vleermuizen [♦]	③				①			②			③	
Das	Dassen(burchten) zijn jaarrond beschermd!											
Steenmarter ^{🐾🐾}				kraamtijd								
Boommarter ^{🐾🐾🐾}				kraamtijd								
Broedvogels [↓]			Indicatief 15 maart – 15 augustus									
Reptielen [⊖]	Tabel 2 en 3 soorten in verband met habitatbescherming nader onderzoeken!											
Amfibieën [⊖]	Tabel 2 en 3 soorten in verband met habitatbescherming nader onderzoeken!											
Vissen [⊖]	Tabel 2 en 3 soorten in verband met habitatbescherming nader onderzoeken!											
Dagvlinders [🦋]	Tabel 2 en 3 soorten in verband met habitatbescherming nader onderzoeken!											
Libellen [🦋]	Tabel 2 en 3 soorten in verband met habitatbescherming nader onderzoeken!											
Vaatplanten [🌿]	Tabel 2 en 3 soorten in verband met zeldzame groeiplaatsen nader onderzoeken!											



Natuurkalender voor het plannen van activiteiten in verband met soortbescherming

Opmerkingen

◆ Nederlandse vleermuizen (grotbewoners uitgezonderd) gebruiken in kwetsbare levensfasen ① kraamkolonies in holtebomen of gebouwen ② paar- en baltsplaatsen in gebouwen (o.a. ook kerkzolders) of holtebomen en ③ winterverblijven in holtebomen, gebouwen, oude steenfabrieken of klimaatstabiele kelders en andere koele ruimten. Balts- en paarplaatsen kunnen indicatief voor winterverblijven. Vaste traditionele en omvangrijke winterverblijven zijn vaak bekend.

🐾 Steenmarters gebruiken diverse (dag)rustplaatsen in holtebomen en gebouwen door hun leefgebied en kunnen zich gemakkelijk verplaatsen. Alleen een moeder (moer) met jongen in het nest is kwetsbaar in de periode april-juni. Begin juli verplaatst de steenmarterfamilie zich meestal naar een andere plek.

🐾🐾🐾 Idem voor de strikt beschermde boomarter met betrekking tot holtebomen en in een zeldzaam geval ook gebouwen. In dit geval zijn holtebomen een belangrijk component voor het leefgebied, zodat holtebomen in boomarterleefgebied niet zondermeer gekapt mogen worden. Nader onderzoek bij boomarters in het voortplantingsseizoen (begin april – juli) is nodig.

↓ Let op! Een aantal vogelsoorten broedt (inclusief balts en nestbouw) al vroeg in het seizoen (o.a. raaf, bosuil en heggemus) of broeden in sommige gevallen tot laat in de herfst (o.a. houtduif). De nestplaatsen van een aantal soorten (o.a. steenuil) zijn jaarrond beschermd. Gebruik zoveel mogelijk de inventarisatierichtlijnen van SOVON Vogelonderzoek Nederland. Integraal broedvogelonderzoek voor een ecologische beoordeling vergt minimaal vier veldbezoeken verspreid over het zomerhalfjaar afhankelijk van de verwachte soorten.

⊖ Gebruik inventarisatierichtlijnen van de RAVON Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland om soorten in kaart te brengen wanneer ze het beste zichtbaar zijn of zijn te vangen, meestal in het zomerhalfjaar met piekperioden voor sommige soorten.



Natuurkalender voor het plannen van activiteiten in verband met soortbescherming

- Gebruik de inventarisatierichtlijnen van de Vlinderstichting of Stichting EIS om beschermde of zeldzame dagvlinders, libellen en andere entomofauna in kansrijk habitat vast te leggen gedurende activiteits- of vliegperiodes. Afhankelijk van de verwachte soorten vindt inventarisatie plaats op bepaalde momenten in het zomerhalfjaar. Voor andere beschermde ongewervelden (o.a. het weekdiertje platte schijfhoorn) is nader onderzoek in de geëigende periode (bijvoorbeeld in juli voor het vliegend hert) noodzakelijk.
- Gebruik de inventarisatierichtlijnen van o.a. Floron om beschermde of zeldzame soorten op kansrijke standplaatsen vast te leggen tijdens groeiperiodes van verwachte beschermde of zeldzame soorten.

Overige opmerkingen:

- Deze lijst met soortgroepen is niet uitputtend, maar legt nadruk op veel voorkomende situaties en soorten met vaste rust- en verblijfplaatsen.
- De Zorgplicht is altijd van toepassing! D.w.z. er moet zoveel mogelijk worden gedaan om wilde planten en dieren te sparen, waaronder ook 'licht beschermde' (Tabel 1) soorten en Rodelijstsoorten.

Door EcoNatura (geactualiseerd op 12 juni 2012) – Ecologisch onderzoek voor natuur, landschap en duurzaamheid
(www.econatura.nl)

